

Score ABCDD

RISQUE D'AVC DANS LES 7 JOURS SUIVANT UN AIT

- ▶ A = age
- ▶ B = blood pressure (pression artérielle)
- ▶ C = clinical features (présentation clinique)
- ▶ D = duration (durée des symptômes)
- ▶ D = diabète

Activité	Description	Score
Age	Inférieur ou égal à 60 ans	0
	Supérieur à 60 ans	1
Pression artérielle	PAS \leq 140 ou PAD \leq 90 mmHg	0
	PAS $>$ 140 ou PAD $>$ 90 mmHg	1
Présentation clinique	Autres manifestations	0
	Trouble de la parole sans faiblesse musculaire	1
	Faiblesse musculaire unilatérale	2
Durée des symptômes	$<$ 10 min	0
	$>$ 10 min et $<$ 59 min	1
	$>$ 60 min	2
Diabète		1

INTERPRETATION

Le risque d'AVC à une semaine :

- ▶ score égal à 0, 1, 2 ou 3 => risque d'AVC = 0
- ▶ score égal à 4 => risque d'AVC = 2 % environ
- ▶ score égal à 5 => risque d'AVC = 15 % environ
- ▶ score égal à 6 => risque d'AVC = 35 % environ

Score entre 0 et 3 : effectuer rapidement un bilan avec scanner ou IRM, ECG, éventuellement en ville si filière MG/ radiologue et neurologue bien organisée ; risque à 3 mois 3 %.

Score entre 4 et 5 : Bilan idem, Hospitalisation ; Risque à 3 mois 10 %.

Score entre 6 et 7 : IRM en urgence ; Hospitalisation en UNV ; Risque à 48 h : 8 %.